

LaDiva[®]

Arylex[™] active

ERBICIDA

**TRATTA LA TUA COLTURA
COME UNA VERA REGINA!**



**Un nuovo approccio al diserbo del colza!
Batti le infestanti alle tue condizioni e con
una strategia estremamente flessibile.**

LaDiva® è il nuovo erbicida Corteva che estende anche al mondo del colza i benefici e l'efficacia del principio attivo Arylex™ active.


Grazie alla sua selettività in post-emergenza e all'ampio spettro d'azione sulle principali infestanti a foglia larga autunno-vernine, permette ai coltivatori di personalizzare la gestione agronomica della coltura.

- Efficace in un solo passaggio, anche su specie resistenti come papavero e matricaria.
- Più flessibilità, con un'ampia finestra di impiego dalle 2 alle 9 foglie vere.
- Protegge e valorizza il potenziale produttivo della coltura.
- Più tempo da dedicare ad una buona semina.

Composizione e formulazione:

LaDiva è una miscela pronta di tre principi attivi del gruppo delle auxine sintetiche (gruppo HRAC/WSSA 4) ad elevata efficacia: Arylex active, picloram e aminopirialid.

L'innovativo formulato concentrato emulsionabile di nuova generazione (NeoEC) presenta un **profilo ambientale molto favorevole**, in quanto privo di distillati del petrolio. Garantisce inoltre elevate prestazioni in termine di **solubilità**, **omogeneità di dispersione** sulla foglia, **penetrazione** nella pianta e **velocità** di assorbimento nei tessuti.



Spettro d'azione:

LaDiva offre un'elevata capacità di controllo sulle principali foglie larghe di interesse agrario:

Infestanti altamente sensibili	Infestanti sensibili o mediamente sensibili	Infestanti moderatamente sensibili
<p>Centaurea (<i>Centaurea cyanus</i>) Fumaria (<i>Fumaria sp</i>) Camomilla (<i>Matricaria chamomilla</i>) Papavero (<i>Papaver rhoeas</i>)</p>	<p>Geranio sbrindellato (<i>Geranium sp.</i>) Geranio selvatico (<i>Geranium sp.</i>) Grespino (<i>Sonchus arvensis</i>) Senecio (<i>Senecio vulgaris</i>) Attaccamani (<i>Galium aparine</i>) Borsa del pastore (<i>Capsella b. pastoris</i>) Stellaria (<i>Stellaria media</i>) Viola dei campi (<i>Viola arvensis</i>)</p>	<p>Veronica (<i>Veronica persicaria</i>)</p>

LaDiva è particolarmente attivo anche sulle popolazioni di papavero e camomilla resistenti agli attuali erbicidi in commercio.




Epoca e dose di impiego:

LaDiva può essere usato in post-emergenza della coltura dalle 2 foglie vere (stadio B2) fino alle 9 foglie vere (corrispondenti alla completa formazione della rosetta).

Applicare LaDiva alla dose di 0,2 - 0,25 L/ha, una sola volta per stagione, in post-emergenza del colza e delle infestanti.

È possibile effettuare un solo trattamento ogni 2 anni alla dose bassa (0,2 L/ha) e una volta ogni 3 anni alla dose alta (0,25 L/ha) sullo stesso appezzamento.

Per un controllo ottimale di tutte le infestanti sensibili a LaDiva, è consigliato l'impiego a dose massima nell'intervallo tra le 2 e le 4 foglie.



Miscibilità:

LaDiva è miscibile con i principali erbicidi registrati su colza: graminicidi, propizamide e Lontrel® 72 SG.

Selettività:

LaDiva è selettivo su tutti gli ibridi di colza attualmente coltivati, sia convenzionali che tolleranti agli erbicidi, fino alla completa formazione della rosetta.

Successione colturale:

In seguito all'impiego di LaDiva per il diserbo del colza, è possibile seminare:

- dopo 60 giorni: colza, cereali da paglia, erbe foraggere, mais, canapa e sorgo
- dopo 120 giorni: lino, senape, rapa
- dopo 150 giorni: girasole e barbabietola
- dopo 14 mesi: legumi compresi soia, fagioli e piselli

Al fine di evitare la presenza di residui nelle colture successive o alternative, non seminare ortaggi a foglia prima di 120 giorni dopo il trattamento.

LaDiva®

Arylex™ active

ERBICIDA**COMPOSIZIONE:**

Halauxifen-metile puro
(nome commerciale Arylex™ active)..... 10 g/L
(pari a 9,6 g/l di acido equivalente)

Picloram puro..... 48 g/L

Aminopyralid puro..... 32 g/L

Coformulantiq.b. a g 100

FORMULAZIONE:

Concentrato emulsionabile

CONFEZIONE:

Bottiglia da 250 ml.

REGISTRAZIONE:

N° 18409 del 19 dicembre 2023

GRUPPO HRAC: O**GRUPPO HRAC/WSSA:** 4**INTERVALLO DI SICUREZZA:**

Non necessario.

CLASSIFICAZIONE:**PERICOLO**

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute.
Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

®, ™ Marchi commerciali di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2024 Corteva.